De ce point on descend dans la vallée de la Villette par des sentiers rocailleux et très-inclinés. Sur les rochers qui les longent à gauche, on recueille :

Saponaria lutea.
Draba Johannis.
Alsine Villarsii.
Saxifraga aspera.
Primula pedemontana.
Etc.

Dans les éboulis traversés par le sentier croissent les *Hieracium prenanthoides* et *Lychnis Flos Jovis.*

Au fond de la vallée de la Villette, après avoir traversé le torrent qu'alimentent les neiges du sommet de la combe d'Ambin, on rencontre des terrains un peu boisés dans lesquels végètent :

Knautia virgata *Jord.*
Gnaphalium dioicum.
Sambucus racemosa β. laciniata.
Trifolium pratense *var.* flore luteo.
Pirola secunda.
— chlorantha.
— uniflora.

Ces trois Piroles ont été récoltées dans un bois situé au-dessus du village de Bramans. En suivant toujours la même route, on arrive à ce village un peu au-dessus des rochers calcaires où nous avons signalé la présence du *Matthiola varia.*

On se dirige ensuite sur Saint-Michel, où l'on peut coucher. Le lendemain on reprend le chemin de fer pour Chambéry.

NOTE DE M. Éd. BESCHERELLE SUR LES MOUSSES RÉCOLTÉES PENDANT LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE CHAMBÉRY EN AOUT 1863.

L'ancienne province de Savoie, actuellement annexée à la France, devait offrir aux bryologues le même attrait qu'aux phanérogamistes. Ses hautes montagnes, couronnées de neiges perpétuelles et sillonnées d'innombrables torrents, attiraient l'attention de botanistes qui espéraient y rencontrer des espèces rares ou nouvelles pour la flore française, et, d'après le travail qui précède, on peut voir que leurs espérances n'ont pas été trompées. Quant à la bryologie, elle n'a pas été servie avec la même profusion; à part quelques espèces spéciales, toutes les Mousses récoltées dans la région que la Société a visitée appartiennent à la région montagneuse du Dauphiné et même des Vosges ; quelques-unes sont communes aux environs de Paris. Il convient du reste de remarquer que nos recherches n'ont porté que sur quelques points du département de la Savoie, et que, si nous avions pu explorer avec soin les pâturages élevés, les fissures des rochers voisins des neiges, nous aurions eu à joindre à notre liste un certain nombre d'espèces de la Suisse que l'on retrouve près de Chamonix et que notre collègue M. Venance Payot a déjà signalées à l'attention des bryologues.

Quoi qu'il en soit, une première excursion au Mont-Cenis nous a permis de récolter de très-jolies Mousses, telles que: *Gymnostomum curvirostrum*, *Cynodontium virens*, *Eucladium verticillatum*, *Distichium capillaceum*, *Lepto-*

trichum glaucescens, *Dissodon Frœlichianus*, *Webera albicans*, *Bryum turbinatum*, *Amblyodon dealbatus*, *Catoscopium nigritum*, *Meesia uliginosa*, *Timmia megapolitana*, *Myurella julacea*, *Orthotrichum rufescens*, *Hypnum Halleri*, *H. palustre*.

Parmi les espèces spéciales nouvelles pour la flore française se trouvent :

DICRANUM MUEHLENBECKII, signalé déjà au mont Salève près Genève.

ANACALYPTA LATIFOLIA, qui n'avait été récolté jusqu'ici que sur les hauts sommets des Alpes et du Jura Suisse.

ENCALYPTA COMMUTATA, trouvé déjà par M. Pâris sur le mont Marjériaz, près Chambéry.

— APOPHYSATA, non encore indiqué en France ni en Savoie.

ORTHOTHECIUM CHRYSEUM, belle espèce signalée seulement dans les Alpes de la Carinthie et du nord de l'Europe.

BRACHYTHECIUM SALICINUM, plante élégante trouvée déjà par Kneiff aux environs de Strasbourg.

AMBLYSTEGIUM SPRUCEI, la plus petite espèce du genre, dont la localité la plus voisine est en Suisse.

Dans la liste qui suit, nous n'avons pas cité un grand nombre d'espèces de la région champêtre qu'il nous a paru sans intérêt de rapporter ; on en trouvera l'énumération dans le consciencieux travail publié par notre honorable collègue M. le commandant Pâris sur les Mousses des environs immédiats de Chambéry (1).

LISTE DES MOUSSES RÉCOLTÉES EN SAVOIE PENDANT LA SESSION DE CHAMBÉRY, PAR MM. BESCHERELLE, LE DIEN ET ROZE.

Gymnostomum calcareum *Nees* et *Hornsch.* — Chambéry (stérile).
— rupestre *Schwgr.* Ibid.
— curvirostrum *Ehrh.* — Parois humides de la route de Modane à Lanslebourg.
Cynodontium virens *Hedw.* — Lanslebourg, Mont-Cenis.
Dicranum Muehlenbeckii *Br.* et *Sch.* — Mont-Cenis (stérile). R.
— fuscescens Turn. *var.* γ. flexicaule *Brid.* — Mont-Cenis, Pattes-Creuses.
Anacalypta latifolia *Schwgr.* — Montée de la Ramasse, près de Lanslebourg. RRR.
Eucladium verticillatum *Br.* et *Sch.* — Cascade de Couz (bien fructifié). C.
Distichium capillaceum *Br.* et *Sch.* — Commun de Lanslebourg à l'Hospice du Mont-Cenis.
— — *var.* brevifolium. — Mont-Cenis.
— inclinatum *Br.* et *Sch.* — Prairies du Mont-Cenis.
Leptotrichum glaucescens *Hampe.* — Rochers du Mont-Cenis, près du lac.
Trichostomum crispulum *Bruch.* — Mont-Cenis.
Desmatodon latifolius *Br.* et *Sch.* — Ibid.
Barbula inclinata *Schwgr.* — Pas-du-Roc à Saint-Michel. C. (mais stérile).
— tortuosa *Web.* et *Mohr.* — Mont-Cenis, montée.
— subulata *Brid. var.* angustata *Sch.* (*in litteris*). — Mont-Cenis.
— aciphylla *Br.* et *Sch.* — Montée du Mont-Cenis.

(1) Voyez plus bas, p. 764.

Grimmia conferta *Funk.* — Rochers, près de l'Hospice du Mont-Cenis.
Hedwigia ciliata *Hedw. var.* leucophæa *Sch.* — Mont-Cenis, Saint-Michel.
Orthotrichum obtusifolium *Schrad.* — Sur les arbres, à Saint-Michel (stérile).
— Sturmii *Hop.* et *Hornsch.* — Rochers, à Saint-Michel. C.
Encalypta commutata *Nees* et *Hornsch* — Mont Cenis. AR.
— vulgaris *Hedw. var.* β. obtusa. — Chambéry.
— — δ. elongata. — Mont-Cenis, près du lac.
— rhabdocarpa *Schwgr.* — Mont-Cenis, Pattes-Creuses. C.
— ciliata *Hedw.* — Ibid. C.
— apophysata *Nees* et *Hornsch.* — Ibid. R.
— streptocarpa *Hedw.* — Lanslebourg (stérile).
Dissodon Frœlichianus *Grev.* et *Arn.* — Pâturages du Mont-Cenis. A.R.
Funaria hibernica *Hook.* — Près de Chambéry.
Leptobryum piriforme *Sch.* — Montée du Mont-Cenis. A.R.
Webera cruda *Sch.* — Ibid. C.
— albicans *Sch.* — Pattes-Creuses. C.
— — *var.* glacialis. — Ibid. C.
Bryum pendulum *Sch.* — Mont-Cenis.
— inclinatum *Br.* et *Sch.* — Lanslebourg.
— cirratum *Hopp.* et *Hornsch.* — Ibid.
— pallescens *Schl. var.* β. boreale. — Mont-Cenis.
— Funkii *Schwgr.* — Ibid.
— pallens *Swartz.* — Lanslebourg.
— pseudo-triquetrum *Schwgr.* — Ibid. CC.
— turbinatum *Schwgr.* — Mont-Cenis. C.
— — *var.* β. gracilescens. — Pattes-Creuses. C.
Amblyodon dealbatus *Pal. Beauv.* — Lanslebourg.
Cato-copium nigritum *Brid.* — Parois humides de la route de Modane à Lanslebourg. A.C.
Meesia uliginosa *Hedw.* — Mont-Cenis. C.
— — *var.* β. alpina. — Ibid. C.
Bartramia ithyphylla *Brid.* — Ibid. C.
— Œderi *Schrad.* — Ibid. C.
Philonotis fontana *Brid.* — Prairies autour du lac du Mont-Cenis ; Pattes-Creuses.
— calcarea *Sch.* — Lanslebourg.
Timmia megapolitana *Hedw.* — Mont-Cenis.
— austriaca *Hedw.* — Montée de la Ramasse (stérile).
Polytrichum gracile *Menzies.* — Prairies du Mont-Cenis.
Myurella julacea *Br.* et *Sch.* — Montée de l'Hospice du Mont-Cenis (stérile). R.
Pseudoleskea atrovirens *Br.* et *Sch.* — Ibid. A.C.
— catenulata *Br.* et *Sch.* — Ibid. R. (stérile).
Climacium dendroides *Web.* et *M.* — Mont-Cenis (stérile).
Orthothecium rufescens *Br.* et *Sch.* — Cascade de Couz près Chambéry. C.
— chryseum *Br.* et *Sch.* — Pâturages du Mont-Cenis (stérile). R.
Brachythecium salicinum *Br.* et *Sch.* — Montée du Mont-Cenis, au pied des arbres pourris. RR.
— reflexum *Br.* et *Sch.* — Montée du Mont-Cenis.
Amblystegium Sprucei *Br.* et *Sch.* — Ibid. RR.
Hypnum Halleri *Linn. fil.* — Pattes-Creuses. A.C.
— uncinatum *Hedw.* — Montée de l'Hospice.
— commutatum *Hedw.* — De Lauslebourg à l'Hospice. CC.
— — *var.* alpestre. — Pattes-Creuses.
— palustre *L.* — Ibid. CC.